



I.A. x 100,000 hab. Casos Confirados de Dengue Clásico en los países Andinos. 2002 - 2005

Países	AÑOS				
	2002	2003	2004	2005	Total
Bolivia	3		8		3
Colombia	53	59	23	37	43
Chile	4	0	0	0	1
Ecuador	58	84	20	47	52
Perú	8	2	6	3	5
Venezuela	138	94	109	151	123
Total	52	46	32	46	44

Situación del Dengue Hemorrágico en los países de la Región Andina

Para el periodo 2002-2005 se ha reportado un total de 9,790 casos confirmados de dengue hemorrágico, siendo la incidencia acumulada de 2 casos por 10^5 hab. La población afectada tanto para el 2002 como para 2003 fue 3 casos por 10^5 hab., para el 2004 fueron 2 casos y para el 2005 fueron 3 casos por 10^5 hab. La tendencia de dengue hemorrágico en los países andinos, tiene un comportamiento similar al dengue clásico, tanto para toda la Región como en cada país, la diferencia esta marcada por las tasas, que son mucho menores a dengue clásico.


En general, se observa un ligero incremento de casos para el año 2005 respecto al 2004 (de 2 a 3 por 10^5 hab.), llamando nuestra atención el incremento en Venezuela, país que habría reportado tasas superiores a los otros 5 países Andinos durante el periodo 2002 y 2005, además ha mostrado incremento en sus tasas del 2004 a 2005 (de 8 a 10 casos por 10^5 hab.), superando incluso sus tasas del

2003. Colombia y Ecuador mostrarían un ligero incremento de la incidencia para el 2005. Perú y Bolivia tienen tasas inferiores al 1×10^5 hab. en estos cuatro años, con un incremento ligero para el 2004 y su contigua disminución en el 2005. Bolivia habría presentado un total de 25 casos en el 2005, cifra que si se interpreta como tasa no alcanza a ser 1 caso por 10^5 hab., finalmente Chile ha reportado estar libre de esta enfermedad durante este periodo.

Basados en estas observaciones, ponemos en alerta epidemiológica para dengue hemorrágico a los países de la Región Andina, poniendo especial atención en Ecuador y redoblando esfuerzos en Venezuela.



I.A. X 100,000 HAB. DENGUE HEMORRAGICO EN LOS PAISES DE LA SUB REGION ANDINA - RAVE - ORAS-CONHU, 2002 - 2005



Porcentaje de Confirmación para Dengue Hemorrágico

La distribución del porcentaje de confirmación tiene particulares características en los países que

reportaron, observando en el caso del Ecuador, que casi la totalidad de sus casos tuvieron diagnóstico confirmatorio por laboratorio. En Colombia la confirmación por laboratorio es baja y Bolivia en el 2004 habría confirmado el 56% de casos.

PORCENTAJE DE CONFIRMACIÓN 2002 - 2005, DENGUE HEMORRAGICO, RAVE ORAS - CONHU

