



**Organismo Andino de Salud
Convenio Hipólito Unanue**



SITUACIÓN ACTUAL DE LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL Y EN LOS PAÍSES ANDINOS

**Luis Beingolea More
Bertha Luz Pineda Restrepo**

Lima, 05 de abril de 2021




Casos de COVID-19 a nivel Mundial

05 de abril de 2,021



Situación de la Pandemia en el mundo al 05-04-2021. 08:50 h





Distribución de casos confirmados y fallecidos por COVID-19 por regiones en el mundo. 05-04-2021 9:00

Global/Regiones	Casos confirmados	%	Fallecidos confirmados	%	Letalidad (%)
Mundo	131,888,238	100	2,865,423	100	2.2
Europa	40,438,694	30.66	926,213	32.32	2.3
NA/CA/C	36,179,405	27.43	824,538	28.78	2.3
Asia	29,335,083	22.24	434,415	15.16	1.5
Suramérica	21,571,928	16.36	564,994	19.72	2.6
Africa	4,304,972	3.26	114,120	3.98	2.7
Oceanía	58,156	0.04	1,143	0.04	2.0

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>



Casos de COVID-19 en el mundo al 04-04-2021



Gráfico de casos confirmados y casos nuevos de COVID-19 en 10 países con mas casos en el mundo. 04-04-2021







Gráfico de fallecidos y nuevos fallecidos de COVID-19 en 10 países con mas casos en el mundo. 04-04-2021





Avances de la vacunación contra el COVID-19 en el mundo

Avances en la vacunación contra el coronavirus

5 de abril 2021 – Hora 8:30



Países	Dosis administradas		% de población	
	Por 100 personas	Total	Vacunado	Total/ vacunado
Mundo	8.7	664,545,727		
Israel	114	10,108,889	59%	54%
Seychelles	105	102,080	-	-
Emiratos Árabes Unidos	89	8,578,979	-	-
Bhutan	62	466,811	62%	
Chile	58	10,787,042	37%	21%
Reino Unido	56	36,904,755	47%	8.1%
Bahréin	52	817,379	34%	18%
Estados Unidos	50	165,053,746	32%	19%
Maldivas	47	243,749	-	-
Mónaco	47	18,081	25%	22%

Fuente: OurWorldInData The New York Times

<https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html>

Avances de vacunación contra el coronavirus en la región Andina



Puesto	Países	Vacunas	Dosis administradas		% de población	
			Por 100 personas	Total	Vacunado	Totalmente vacunado
87	Bolivia	Sputnik V, Sinopharm	2.8	321,807	1.8%	1.0%
5	Chile	Pfizer/ BioNTech, Sinovac	58	10,787,042	37%	21%
76	Colombia	Pfizer/BioNTech, Sinovac	4.8	2,381,049	4.0%	0.8%
96	Ecuador	Pfizer/BioNTech	1.7	283,106	1.2%	0.5%
88	Perú	Sinopharm, Pfizer	2.7	861,926	1.8%	0.9%
121	Venezuela	Sputnik V	0.5	184,805		

Total dosis administradas: 14,819,735


Fuente: Ministerios de Salud andinos, OurWorldInData
y The New York Times

<https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html>

Consulta 5-04-2021 – 10:00 hora Perú



Dosis de vacuna administradas por día por cada 100 personas en el mundo. 03-04-2021




Source: Official data collated by Our World in Data – Last updated 3 April, 09:08 (London time)

[OurWorldInData.org/coronavirus](https://ourworldindata.org/covid-vaccinations)



Número de personas totalmente vacunadas en el mundo al 03-04-2021




Source: Official data collated by Our World in Data – Last updated 4 April, 08:15 (London time)

[OurWorldInData.org/coronav](https://ourworldindata.org/covid-vaccinations)

<https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>




Porcentaje de población totalmente vacunadas en países del mundo al 03-04-2021






Proporción de población que esta de acuerdo en ser vacunado si tuviera la oportunidad . 30 marzo 2021



Fuente: Imperial College London YouGov Covid 19 Behaviour Tracker Data Hub – Última actualización 30 marzo 2021, 14:00 (Londres)
<https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>



Casos diarios por millón de hab en dos países del mundo 02-04-2021



- Porcentaje de vacunación de Israel en primera dosis 59 % y 54 % con dos dosis.
- Porcentaje de vacunación de EEUU en primera dosis 31 % y 18 % con segunda dosis

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC B



Medidas Israel

- "Los últimos análisis revelan que los individuos no vacunados tienen 44 veces más riesgo de desarrollar una infección sintomática y 28 veces más probabilidades de morir por la enfermedad",
- El pasaporte, que está contenido dentro de una aplicación, es expedido por el ministerio de salud y tiene una validez de seis meses, que comienza una semana después de la segunda dosis.
- No está permitida la realización de conciertos masivos y los eventos deportivos pueden hacerse con una capacidad máxima del 75%, y un límite de 300 personas en un espacio interior y 500 en un espacio al aire libre.



Medidas Israel

- 2.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que será utilizada en pacientes que han recibido un trasplante de órganos y aquellos con insuficiencia renal, según le informó un funcionario israelí a la agencia de noticias Reuters.
- La estrategia del país con la tasa de vacunación contra la covid-19 más alta del mundo
- Esto tiene lugar después de que el ministro de salud palestino llegara a un acuerdo con el ministerio de salud israelí para vacunar a 100.000 palestinos que trabajan en el país.
- Se estima que cerca de 5 millones de palestinos están a la espera de la vacuna.




Medidas Israel

- El sábado, el ministerio de salud dijo que estudios revelaban que el riesgo de la enfermedad provocada por el virus había caído en un 95,8% entre la gente que había recibido las dos dosis de la vacuna Pfizer.
- También encontró que la vacuna era un 98% efectiva en prevenir la fiebre o los problemas respiratorios.
- El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dice que espera que el 95% de los israelíes de más de 50 años estén vacunados en las próximas dos semanas.



FIGURE 1. First- and second-dose COVID-19 vaccination coverage* among persons aged <50 and ≥ 70 years[†] — Israel, December 20, 2020–February 9, 2021




* Dose 2 shaded areas include those who received dose 1.

[†] Total population: 6.4 million (aged <50 years); 0.735 million (aged ≥ 70 years).




FIGURE 2. Number and ratio of COVID-19 patients aged <50 and ≥70 years requiring mechanical ventilation — Israel, October 8, 2020–February 9, 2021






Casos confirmados por millón de hab en países que usan vacuna Sinopharm 03-04-2021





Índice de positividad en países que usan vacuna Sinopharm 01-04-2021




Source: Official data collated by Our World in Data

CC BY



Países con al menos una dosis de vacuna al 02-04-2021




Source: Official data collated by Our World in Data

CC



Países con dos dosis de vacuna a 02-04-2021





Disminución de pacientes con COVID-19 que requieren ventilación mecánica tras la implementación de un Programa Nacional de Vacunación COVID-19 — Israel, diciembre de 2020-febrero de 2021

PHOSP-COVID Grupo Colaborativo, Rachael Andrea Evans, Hamish McAuley, Ewen M Harrison, Aarti Shikotra, Amisha Singapuri, Marco Sereno, Omer Elneima, Annemarie B Docherty, Nazir I Lone, Olivia C Leavy, Luke Daines, J Kenneth Baillie, Jeremy S Brown, Trudie Chalder, Anthony De Soyza, Nawar Diar Bakerly, Nicholas Easom, John R Geddes, Neil J Greening, Nick Hart, Liam G Heaney, Simon Heller, Luke Howard, José Jacob, R Gisli Jenkins, Caroline Jolley, Steven Kerr, Onn M Kon, Keir Lewis, Janet M Señor, Gerry P McCann, Stefan Neubauer, Peter JM Openshaw, Paul Pfeffer, Matthew Rowland, Malcolm G Semple, Sally J Singh, Aziz Sheikh, David Thomas, Mark Toshner, James D Chalmers, Ling-Pei Ho, Alex Horsley, Michael Marks, Krisnah Poinasamy, Louise V Wain, Christopher E Brightling

<https://doi.org/10.1101/2021.03.22.21254057>; this version posted March 24, 2021.
<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7009e3.htm>



Introducción

- Israel inició una campaña nacional de vacunación utilizando la vacuna Pfizer-BioNTech BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) el 20 de diciembre de 2020, priorizando a las personas de >60 años, a los trabajadores sanitarios y a las personas con enfermedades subyacentes.
- En febrero de 2021, la cobertura de vacunación en 2 dosis entre las personas de ≥ 70 años era del 84% y del 10% entre las personas de 50 años.



Introducción

- Para evaluar el efecto de la vacunación COVID-19 en la aparición de enfermedades graves, se realizó un estudio ecológico.
- La proporción de pacientes con COVID-19 de ≥ 70 años que requirieron ventilación mecánica a los mayores de 50 años disminuyó un 67% de octubre a diciembre de 2020 a febrero de 2021.



**COVID-19 vaccine safety update
Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP)
January 27, 2021
Tom Shimabukuro, MD, MPH, MBA
CDC COVID-19 Vaccine Task Force
Vaccine Safety Team**

•



- V-safe es una herramienta para teléfonos inteligentes que utiliza mensajes de texto y encuestas web para proporcionar chequeo de salud personalizados después de recibir una vacuna COVID-19.
- Recibirá mensajes todos los días, la 1ª semana; semanalmente hasta 6 semanas; luego 3, 6 y 12 meses)
- A través de V-safe, puede informar rápidamente a los CDC si tiene algún efecto secundario después de recibir una vacuna COVID-19.

Dependiendo de sus respuestas a las encuestas web, alguien de los CDC puede llamar para revisarlo y obtener más información.

V-safe también le recordará que recibirá su segunda dosis de vacuna COVID-19 si necesita una. Registros de mensajes de texto de los CDC



Resumen de datos de v-safe	Pfizer-BioNTech	Moderna	Total Vacunados COVID-19
Personas que reciben 1 o más dosis en los Estados Unidos *	12,153,536	9,689,497	21,843,033
Registrantes que completen al menos 1 chequeo de salud v-safe †	997,042	1,083,174	2,080,216
Embarazo reportados a V-safe	8,633	6,496	15,131

* Datos de COVID Data Tracker al 24/01/2021

† Datos de v-safe al 20/1/2021, 5:00 a.m. ET



Reactogenicidad reportada en V-safe

Reacciones sistémicas y locales día 0-7 *, †	% Todas las vacunas	% Pfizer-BioNTech dosis 1	% Pfizer-BioNTech dosis 2	% Moderna dosis 1
Dolor	70.7	67.7	74.8	70.1
Fatiga	33.4	28.6	50.0	29.7
Dolor de cabeza	29.4	25.6	41.9	26.0
Mialgia	22.8	17.2	41.6	19.6
Calosfrios	11.5	7.0	26.7	9.3
Fiebre	11.4	7.4	25.2	9.1
Edema	11.0	6.8	26.7	13.4
Dolores articulares	10.4	7.1	21.2	8.6
Nausea	8.9	7.0	13.9	7.7

* Corte de datos de v-safe 14/01/2021, 5:00 a.m. ET

† Reportado en al menos un chequeo médico completado en los días 0 a 7 después de recibir la vacuna



Eventos adversos informados con mayor frecuencia a Vigilancia de Eventos Adversos después de las vacunas COVID-19 *

Vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (N = 7,307)		Vacuna Moderna COVID-19 (N = 1,786)	
Evento Adverso (*)	N (%)	Evento Adverso (*)	N (%)
Dolor de cabeza	1,550 (21.2)	Dolor de cabeza	430(24.1)
Fatiga	1,192 (16.3)	Pirexia	33(18.6)
Mareo	1,113 (15.2)	Calosfrios	315 (17.6)
Nausea	1,014 (13.9)	Dolor	290 (16.2)
Calosfrios	983 (13.5)	Mareos	289 (16.2)
Pirexia	962 (13.2)	Fatiga	287 (16.1)
Dolor	958 (13.1)	Nauseas	281 (15.7)
Dolor en el lugar de Inyeccion	716 (9.8)	Dolor en el lugar de Inyeccion	208(11.6)
Dolor en extremidades	610 (8.4)	Dolor en extremidades	189 (10.6)
Disnea	536 (7.3)	Disnea	172 (9.6)

<https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/06-COVID-Shimabukuro.pdf>

* Informes recibidos hasta el 18 de enero de 2021; † Los eventos adversos no son mutuamente excluyentes



Reporte de anafilaxias a Vigilancia de Eventos Adversos después de las vacunas COVID-19 *

Características	Pfzer-BioNTech (N=50)	Moderna (N=21)
Edad Media Año (Rango)	38.5 (26-63)	39 (24-63)
Mujer (%)	47 (%)	21 (100)
Minutos hasta el inicio de los síntomas, media (rango)	10 (<1-1,200[20 hr])	10 (<1-45)
Inicio de los síntomas $\leq$ 15 minutos (%)	37 (74)	18 (86)
Inicio de los síntomas $\leq$ 30 minutos (%)	45(90)	19 (90)
Horas documentadas de alergias o reacciones alérgicos (%)	40 (80)	18 (86)
Horas documentadas de anafilaxia previa (%)	12 (24)	5 (24)
Número de dosis (1 ^a , 2 ^a , desconocida)	42, 3, 5	19, 1, 1

<https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/06-COVID-Shimabukuro.pdf>

* Informes recibidos hasta el 18 de enero de 2021; † Los eventos adversos no son mutuamente excluyentes



Tasas estimadas de notificación de anafilaxia después de las vacunas COVID-19 basado en informes VEARS y dosis informadas administradas *

Reporte de dosis de vacuna administradas	Casos de anafilaxia	Tasa de notificación (período analítico del 14 de diciembre al 18 de enero)
Pfizer-BioNTech: 9,943,247	50	5,0 por millón de dosis admin.
Moderna: 7.581.429	21	2.8 por millón de dosis admin.

* Datos hasta el 18 de enero de 2021

- Dosis totales de vacuna COVID-19 administradas hasta el 18 de enero por sexo: mujeres 61%, hombres 36%, desconocidos 3%
- Tasa informada anteriormente para la vacuna Pfizer-BioNTech: 11,1 por millón de dosis administradas (14 de diciembre-23 de diciembre)

<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7002e1.htm>

- Tasa informada anteriormente para la vacuna Moderna: 2,5 por millón de dosis administradas (del 21 de diciembre al 10 de enero)

<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7004e1.htm>

COVID-19 en los países andinos

5 de abril 2021 – Hora 9:00



País	Casos totales	Muertes totales	Total recuperados	Total Casos/ 1 millón de habitantes	Muertes / 1 millón habitantes
Bolivia	274,934	12,324	224,998	23,313	1,045
Chile	1,026,785	23,644	958,400	53,366	1,229
Colombia	2,446,219	64,094	2,317,564	47,691	1,250
Ecuador	335,682	16,956	290,314	18,811	950
Perú	1,582,367	52,877	1,500,582	47,492	1,587
Venezuela	166,123	1,662	150,374	5,855	59
Total	5,832,110	171,557	5,442,232	35,671	1,049

Elaborado ORAS-CONHU a partir de datos de <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
Institutos Nacionales de Estadística de los países andinos

BOLIVIA

A full-page photograph of the Salar de Uyuni in Bolivia. The image shows a vast, flat landscape covered in water that perfectly reflects the sky and the large, white, puffy clouds. A single person is walking across the middle ground, their silhouette and reflection clearly visible on the wet surface. The horizon is low, and the sky is filled with a dense layer of clouds. The overall color palette is dominated by the blues of the sky and water, and the whites of the clouds.

Salar de Uyuni

REPORTE COVID-19 EN BOLIVIA N° 385

Domingo, 4 de abril de 2021 (21:00)



467 NUEVOS CASOS



RECUPERADOS
224.998
HOY +450

ACTIVOS
37.612

SOSPECHOSOS
410

DECESOS
12.324
HOY +8

ACUMULADOS
274.934

DESCARTADOS
651.873



Avances vacunación COVID-19 Bolivia

REGÍSTRATE

¿Cómo registrarse?




REPORTE N° 48 DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN BOLIVIA

Domingo, 4 de abril de 2021 (21:30)



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES



Total Vacunados
1ra dosis

206.003


Total Vacunados
2da dosis

117.078

**Dosis Sputnik - V,
Sinopharm y AstraZeneca
para personal de salud y
personas con enfermedad
de base*

CHILE

Salto del Laja, Chile



	Casos COVID-19 en Chile 5 de abril de 2021							
	Casos confirmados acumulados	Casos nuevos totales	Casos nuevos con síntomas	Casos nuevos sin síntomas	Casos nuevos sin notificar	Casos activos confirmados	Fallecidos totales	Casos confirmados recuperados
Arica y Parinacota	17.772	87	48	39	0	597	355	16.808
Tarapacá	29.521	164	95	56	13	1.098	530	27.888
Antofagasta	44.100	217	134	66	17	1.281	884	41.892
Atacama	14.668	117	61	55	1	624	175	13.879
Coquimbo	27.801	220	145	68	7	1.267	534	25.989
Valparaíso	69.217	733	492	111	130	4.679	1.962	62.540
RM	431.597	2.790	1.907	578	305	16.130	13.001	402.161
O'Higgins	39.927	382	282	98	2	2.290	912	36.726
Maule	56.329	556	312	224	20	3.466	1.018	51.839
Ñuble	22.042	125	94	30	1	1.023	415	20.608
Biobío	98.962	797	555	217	25	4.939	1.627	92.350
Araucanía	56.960	452	277	122	53	2.836	707	53.404
Los Ríos	28.675	235	130	103	2	1.757	321	26.603
Los Lagos	62.281	367	249	113	5	1.860	821	59.584
Aysén	3.622	23	14	9	0	149	28	3.448
Magallanes	23.265	39	23	10	6	265	353	22.635
Desconocida	46	0	0	0	0	0	1	46
Total	1.026.785	7.304	4.818	1.899	587	44.261	23.644	958.400

<https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/>

Avances vacunación COVID-19 - Chile



Proceso de Vacunación Masiva

Total País

Total personas
vacunadas
1era dosis



6.937.113

Jornada 01 de abril

Total personas
vacunadas hoy
1era dosis



1.737

Total
dosis
administradas



10.780.764

Total personas
vacunadas hoy
2da dosis



5.146

Fuente: Ministerio de Salud

Información actualizada al 01 de abril de 2021 a las 16:22 hrs.

Chile comenzó vacunación en diciembre de 2020

<https://www.gob.cl/yomevacuno/>

LUNES 05	MARTES 06	MIÉRCOLES 07	JUEVES 08	VIERNES 09	Fin de semana
♦ Personas de 52 años	♦ Personas de 51 años	♦ Personas de 50 años	♦ Rezagados de 50 a 59 años	♦ Rezagados de 50 a 59 años	♦ Rezagados de 50 a 59 años
♦ Continuación segundas dosis a población vacunada con primera dosis.					
♦ Vacunación de población rezagada de grupos objetivos anteriores.					



GOB.CL

Presidente Piñera anuncia nuevo acuerdo con Cansino-Saval: "No es el momento de bajar la guardia, hagamos un último esfuerzo"



GOB.CL

Autoridades de salud reciben embarque más grande de vacunas Pfizer-BioNTech



GOB.CL

Minsal inicia proceso de vacunación de población sana de 59 años

Parque Nacional Natural Sumapaz. Colombia

COLOMBIA



Casos **confirmados**

2,446,219

9022 Hoy



Casos **activos**

56,171



Recuperados

2,317,564

290272 PCR 2027292 Tiempo clínico



Fallecidos

64,094

162 reportados hoy



Contexto más afectado

❖ Bogotá	693,578
❖ Antioquia (Medellín)	384,957
❖ Valle del Cauca (Cali)	210,985
❖ Atlántico (Barranquilla)	161,614
❖ Cundinamarca (sin Bogotá)	111,846
❖ Santander (Cúcuta)	94,915
❖ Bolívar (Cartagena)	70,166

Avances vacunación COVID-19 - Colombia



Mira las entrevistas con otros expertos
Carlos Humberto Saavedra - Vacunación en personas
con enfermedades de base

<https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx>

<https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx>



ECUADOR

Mindo: El País de la Aves, Ecuador



SITUACIÓN NACIONAL POR COVID-19 INFOGRAFÍA N°398

Inicio 29/02/2020- Corte 31/03/2021 08:00



328.755

Casos confirmados con
pruebas PCR



281.684

*Pacientes
recuperados

*86,81% pacientes recuperados respecto a confirmados PCR
Los pacientes recuperados son aquellos que han sido ingresado al sistema de vigilancia con al menos una prueba RT-PCR positivo, han pasado al menos 29 días desde la fecha de inicio de síntomas y están vivos. Este indicador se mostrará acumulado semanalmente cada domingo.



*Detalle de fallecidos

Confirmados	Probables	Total
11.977	4.870	16.847

*Fallecidos por Covid-19: corresponde a los fallecidos confirmados con una prueba RT-PCR positiva, fallecidos probables que son las personas con síntomas, otras pruebas de laboratorio o imagen relacionados a Covid-19, sin una prueba RT-PCR.



760.328

Total casos
descartados



35.920

Casos con alta
hospitalaria



1.113

Hospitalizados
estables



574

Hospitalizados
pronóstico reservado



Se han tomado 1.142.739
muestras para RT-PCR.

Este indicador, de actualización diaria, reporta el número acumulado de las muestras tomadas para la realización de la prueba RT-PCR en los laboratorios autorizados en Ecuador. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso diagnóstico.

Provincia	Confirmados por RT-PCR	Fallecidos confirmados por RT-PCR	Fallecidos probables
Azuay	18.879	338	30
Bolívar	4.980	85	19
Carchi	6.117	210	3
Cañar	4.472	117	8
Chimborazo	5.920	409	129
Cotacachi	9.009	397	94
El Oro	14.986	779	218
Esmeraldas	7.020	302	60
Galápagos	1.346	9	7
Guayas	42.514	2.145	1.726
Imbabura	9.608	285	20
Loja	12.475	364	72
Los Ríos	9.286	409	276
Manabí	25.118	1.794	1.101
Morona Santiago	4.654	48	1
Napo	2.431	90	3
Orellana	2.506	62	21
Pastaza	2.740	73	18
Pichincha	114.664	2.494	328
Santa Elena	3.683	410	280
Sto. Domingo Tsáchilas	9.241	524	124
Sucumbios	3.892	126	3
Tungurahua	11.020	437	327
Zamora Chinchipe	2.194	70	2
Total	328.755	11.977	4.870

A fin de facilitar la lectura del indicador "casos fallecidos" y proporcionar la información desagregada por provincias se desglosa el número de fallecidos con Covid-19 confirmados por una prueba RT-PCR y los fallecidos probables con Covid-19.



% acumulado de casos confirmados por provincia, referente al total nacional

Menor a 1,136%
De 1,136% al 1,99%
De 2% al 3,67%
Mayor igual a 3,68%

La desagregación de casos a nivel provincial, cantonal y tendidas son de pruebas PCR.

Casos confirmados por grupo etario



Casos confirmados por sexo



Llamadas 171, relacionadas a Covid 19	Teleconsulta	Atendidos en establecimientos de salud - MSP	Seguimiento telefónico	Seguimiento en domicilio
1.110.685	133.705	25.048	435.915	113.683

- Llamadas al 171 relacionadas a Covid-19: número de llamadas (acumuladas) atendidas por la plataforma 171 relacionadas a Covid-19.
- Teleconsulta: ciudadanos atendidos a través del APP SALUDEc y por un médico del 171.
- Atendidos en establecimientos de salud del MSP: citas agendadas a través del 171 en establecimientos del primer nivel de atención.
- Seguimiento telefónico: llamadas a pacientes con diagnóstico confirmado, seguidos vía telefónica en primer nivel, por un profesional del MSP.
- Seguimiento en domicilio: visitas domiciliarias a pacientes con diagnóstico confirmado, desde el primer nivel de atención, por un profesional del MSP.

Fuente: Ministerio de Salud Pública

@Salud_Ec

SaludEcuador

Página 1/3

<https://www.salud.gob.ec/actualizacion-de-casos-de-coronavirus-en-ecuador/>

<https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/>

Avances vacunación COVID-19 - Ecuador



#EcuadorSeVacuna

283,106



<https://www.planvacunarse.ec/>

<https://www.coronavirusecuador.com/>



PERÚ

Laguna Chinancocha(Llanganuco). Parque Nacional Huascarán

CASOS POSITIVOS DE COVID 19, SEGÚN ETAPA DE VIDA PERÚ 2020-2021

Rt-PCR + PR + AG

Etapa de vida	N°	Tasa de ataque	Razón de tasas
Niño (0 – 11 años)	49 028	0.76	0.16
Adolescente (12 – 17 años)	45 103	1.45	0.30
Joven (18 – 29 años)	310 983	4.84	1.00
Adulto (30 – 59 años)	896 632	7.18	1.48
Adulto mayor (60 a más años)	280 621	6.78	1.40
Total	1 582 367	4.85	


Tasa de Ataque x 100

El mayor porcentaje de casos se presenta en los adultos que acumulan el 57% de los casos. **Las mayores tasas de ataque corresponde al grupo de adultos y adulto mayor.**

Considerando a los jóvenes como grupo de referencia para la razón de tasas, se evidencia que **el mayor riesgo de enfermarse ocurre en los adultos con un 48% y en los adultos mayores con 40%.**

En el 2020, el 51.5% de los casos corresponden a personas de sexo masculino y 48.5% a personas de sexo femenino.

En el 2021, el 51.8% de los casos corresponden a personas de sexo masculino y 48.2% a personas de sexo femenino.




Avances vacunación COVID-19 - Perú



Fase 1


Meta Vacunados
446,433



Avance
577,608 Registrados

Total Ipress: **9,807**

2ª dosis



Tipo	Cantidad	Porcentaje
Vacunados	309,397	69.3%
Pendiente	137,036	30.7%

VENEZUELA

A scenic landscape photograph of a lake in Venezuela. In the foreground, a wooden pier with railings extends from a stone wall into the calm, blue water. The background features a range of mountains, some covered in dense green forest and others in more arid, brownish vegetation. The sky is a clear, bright blue.

Laguna de Mucubají, Mérida, Venezuela

Casos Positivos

166.123


Casos Recuperados

151.289


Fallecidos

1.662


Casos Nuevos



Fallecidos por día



Distribución por sexo



Mujeres: 76,872

Hombres: 89,251

Avances vacunación COVID-19 - Venezuela




Llega a Venezuela el tercer lote de la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19.

Martes, 30 Marzo 2021 20:49

50 mil dosis para seguir inmunizando a la población.

El ministro Alvarado comentó que “hemos inmunizado a 98 mil trabajadores y trabajadoras de la salud con Sputnik V en Venezuela.



<http://www.mpps.gob.ve/>

<http://www.oncti.gob.ve/NOTICIAS.html>





**Solo estaremos
seguros cuando todos
estemos seguros.**

**Reconstruir nuestra
sociedad con justicia
social y ambiental
para que todas las
personas vivan con
dignidad.**

.

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
Cada vez más juntos por el derecho a la salud



GRACIAS

Muchas gracias al equipo técnico ORAS-CONHU
www.orasconhu.org



#NoBajemosLaGuardia

type

Peaje Villa El Salvador, 31 de Marzo 2021 Lima

Inicio de la semana Santa , 31 de Marzo Perú

- [Semana Santa: cientos de personas salieron de Lima antes de cuarentena | La República \(larepublica.pe\)](https://larepublica.pe)

EN VIVO

20:56



Factores que incrementan el riesgo de una tercera ola en el Perú 2021

- Semana Santa
- Elección presidencial y elección de congresistas
- Circulación de variante P1
- Insuficiente disponibilidad de vacunas
- Relajamiento de medidas no farmacológicas
- Saturación de salas hospitalarias y mayor exposición en la familia



Marchas de rechazo a medidas de confinamiento en Stuttgart, Alemania 04-04-2021

[Marcha en Alemania, cierre en Italia y la Gran Bretaña controla el virus \(ultimahora.com\)](https://ultimahora.com)